



**DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS**

**UNIDAD DE SALUD PÚBLICA**

# **PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD**

## **ESQUEMAS DE VACUNACIÓN 2007**

**Septiembre 2006**

## PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO

<b>ESQUEMA DE VACUNACIÓN</b>			
VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	Al nacer
HEPATITIS B	HEPATITIS B	PRIMERA	Al nacer
		SEGUNDA	2 meses
		TERCERA	6 meses
PENTAVALENTE ACELULAR DPaT + VPI + Hib	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS, e INFECCIONES por H. Influenzae b	PRIMERA	2 meses
		SEGUNDA	4 meses
		TERCERA	6 meses
		REFUERZO	18 meses
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	PRIMERA	2 meses
		SEGUNDA	4 meses
NEUMOCÓCCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	PRIMERA	2 meses
		SEGUNDA	4 meses
		REFUERZO	12 meses
INFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA	6 meses
		SEGUNDA	7 meses
		REVACUNACIÓN	Anual hasta los 35 meses
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS	REFUERZO	4 años
S R P	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA	1 año
		REFUERZO	6 años
SABIN	POLIOMIELITIS	ADICIONALES	
S R	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	ADICIONALES	

## PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE

<b>ESQUEMA DE VACUNACIÓN</b>			
<b>VACUNA</b>	<b>ENFERMEDAD QUE PREVIENE</b>	<b>DOSIS</b>	<b>EDAD</b>
<b>S R</b>	<b>SARAMPIÓN Y RUBÉOLA</b>	<b>REFUERZO</b>	<b>12 años</b>
<b>HEPATITIS B</b>	<b>HEPATITIS B</b>	<b>REFUERZO</b>	<b>12 años</b>
<b>Td pa</b>	<b>DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS</b>	<b>REFUERZO</b>	<b>12 años</b>

## PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER

<b>ESQUEMA DE VACUNACIÓN</b>			
VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD
S R	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	ADICIONAL	20 A 39 AÑOS
Td	TÉTANOS Y DIFTERIA	DOS DOSIS CON INTERVALO DE 4 A 8 SEMANAS	20 A 59 AÑOS
		UNA DOSIS EN CADA EMBARAZO HASTA COMPLETAR CINCO DOSIS	EN MUJERES EMBARAZADAS
		REFUERZO	CADA CINCO O DIEZ AÑOS
ANTINEUMOCÓCCICA 23 VALENTE	NEUMONÍA POR NEUMOCOCO	PRIMERA DOSIS	A PARTIR DE LOS 50 AÑOS
		REFUERZO	CADA CINCO AÑOS
ANTIINFLUENZA	INFLUENZA	ANUAL	A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

## PROGRAMA DE SALUD DEL HOMBRE

<b>ESQUEMA DE VACUNACIÓN</b>			
VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD
S R	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	ADICIONAL	20 A 39 AÑOS
Td	TÉTANOS Y DIFTERIA	DOS DOSIS CON INTERVALO DE 4 A 8 SEMANAS	20 A 59 AÑOS
		REFUERZO	CADA CINCO O DIEZ AÑOS
ANTINEUMOCÓCCICA 23 VALENTE	NEUMONÍA POR NEUMOCOCO	PRIMERA DOSIS	A PARTIR DE LOS 50 AÑOS
		REFUERZO	CADA CINCO AÑOS
ANTIINFLUENZA	INFLUENZA	ANUAL	A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

## PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

<b>ESQUEMA DE VACUNACIÓN</b>			
VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD
Td	TÉTANOS Y DIFTERIA	DOS DOSIS CON INTERVALO DE 4 A 8 SEMANAS	A PARTIR DE LOS 60 AÑOS
		REFUERZO	CADA CINCO O DIEZ AÑOS
ANTINEUMOCÓCCICA 23 VALENTE	NEUMONÍA POR NEUMOCOCO	PRIMERA DOSIS	A PARTIR DE LOS 60 AÑOS
		REFUERZO	CADA CINCO AÑOS
ANTIINFLUENZA	INFLUENZA	ANUAL	A PARTIR DE LOS 60 AÑOS